

Arcispedale S. Maria Nuova
Dipartimento Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA

کولونواسکوپي کے لئے تیاری

اس جانچ کے لئے تیاری کرتے وقت، آپ کوئی بھی جاری معالجے (دل، تنفس، فشار خون، دوران خون، مانع مجموعہ، وغیرہ کے لئے دوائیں) — حتی کہ جانچ والے دن بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔
کوئی اور دست آور دوائیں نہیں لی جاسکتی ہیں۔
جانچ والے دن کوئی زنانہ پٹیاں استعمال نہیں کی جاسکتی ہیں۔
ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق مانع انجماد خون معالجہ بند کر دیں

INDICAZIONI PER LA PULIZIA DELL'INTESTINO


معدے کی صفائی کے لئے ہدایات

جانچ سے قبل والے ہفتہ کے دوران پھل یا سبزیاں نہ کھائیں (گودے اور بیجوں کی وجہ سے جانچ انجام دینا دشوار ہوسکتا ہے؛ یہ بات خاص طور پر کیوی، اسٹرابیری اور انگوروں پر صادق آتی ہے)۔

درج ذیل مشروبات تیاری والی دوائیں لیتے ہوئے اور جانچ سے دو گھنٹہ پہلے تک استعمال کی جاسکتی ہیں: پانی، چائے، گل بابونہ کی چائے، اور بارلی کا پانی - چاہے شکر ڈال کر میٹھا بنایا ہوا ہو۔
کیا چیز کھانی ہے:

- جانچ سے قبل والی شام کو، آپ بغیر سبزیوں والا سوپ لے سکتے ہیں، جیسے سالمونیل یا گوشت کی یخنی؛
- جانچ والے دن ناشتے کے لئے، آپ لے سکتے ہیں: چائے، کافی، شہد، شکر اور دو یا تین ٹکڑے زوی بیک (zwieback)۔

اہم: تیاری والی دوا پیتے وقت متلی یا کڑواہٹ کا احساس ہونا عام سے بات ہے اور یہ تشویش کا باعث نہیں ہے۔
تیاری والی دوا دھیرے دھیرے، مختصر گھونٹ میں پیئیں (اگر اسے فریج میں رکھ دیا جائے تو اس کا ذائقہ بہتر ہو جائے گا)۔
اسے دیگر مشروبات میں ملا کر ذائقے کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔
تاہم، جانچ مناسب طریقے سے انجام دیئے جانے کے واسطے، معدے کی صفائی والی دوا کی پوری مقدار ہی لینا ضروری ہے۔



Arcispedale S. Maria Nuova
Dipartimento Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PREPARATO PER LA PULIZIA DELL'INTESTINO

معدے کی صفائی کی تیاری والی دوا کیسے لی جائے

PREPARATO AD ALTO VOLUME SELG ESSE 1000
(Prodotto a base di Sodio solfato e Polietilenglicole - PEG)
SELG-ESSE 1000 HIGH-VOLUME PREPARATION (سودیم سلفیٹ اور پولی ایتھیلین گلائکول - PEG پر مشتمل مصنوع)
(SELG-ESSE 1000 ہائی والیوم پریپیریشن)

COME ASSUMERE IL PREPARATO

تیاری والی دوا کیسے لی جائے

SELG (SELG) پر مشتمل 4 پاؤچوں میں سے ہر ایک کو 1 لیٹر غیر کاربونیٹڈ پانی میں تحلیل کریں۔
15 منٹ پر جلدی سے اس محلول کا ایک بڑا گلاس پی جائیں۔
اگر جانچ سے 2-3 گھنٹے پہلے تک معدہ پوری طرح سے صاف نہیں ہوا ہے (مطلب یہ کہ آخری بار خارج ہونے والے فضلات شفاف مائع پر مشتمل ہونے چاہئیں)، تو مزید ایک لیٹر محلول لینا ضروری ہے۔

QUANDO ASSUMERE IL PREPARATO


تیاری والی دوا کس وقت لی جائے

اگر آپ کی کولونواسکوپ صبح میں (صبح 9:00 بجے تا دوپہر 1:00 بجے) ہے

کولونواسکوپ سے قبل والی شام میں، شام 6:00 بجے تا رات 9:00 بجے
3 لیٹر پانی میں تحلیل کردہ تیاری والی دوا کے 3 پاؤچ (ہر گھنٹے پر 1 لیٹر) پیئیں۔
جانچ والی صبح میں: صبح 7:00 بجے تا صبح 8:00 بجے
ایک لیٹر پانی میں تحلیل کردہ تیاری والی دوا کا ایک پاؤچ پیئیں۔

اگر آپ کا کولونواسکوپ سہ پہر میں (دوپہر 2:00 بجے کے بعد) ہے

کولونواسکوپ سے قبل والی شام میں، شام 6:00 بجے تا رات 8:00 بجے
معدے کی صفائی کی تیاری والی دوا کی آدھی خوراک (2 لیٹر) پیئیں۔
جانچ والی صبح میں: صبح 9:00 بجے تا صبح 11:00 بجے
تیاری والی دوا کی دیگر آدھی خوراک (دوسرا 2 لیٹر) پیئیں۔



Arcispedale S. Maria Nuova
Dipartimento Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

PREPARATO A BASSO VOLUME MOVIPREP ایک متبادل کے بطور:
(MACROGOL 3350+ACIDO ASCORBICO)
(MOVIPREP LOW-VOLUME PREPARATION) مووی پریپ لو والیوم پریپیریشن
(میکروجول 3350 + اسکاربک ایسڈ)

جانچ کے لئے صحیح طریقے سے تیاری کرنے کے واسطے، آپ کو 2 لیٹر مووی پریپ (MOVIPREP) پینا ضروری ہے۔ یہ پیکج 2 شفاف تھیلیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہر شفاف تھیلی میں، آپ کو ایک بڑا پاؤچ A اور ایک چھوٹا پاؤچ B ملے گا۔ ایک لیٹر مووی پریپ (MOVIPREP) اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ ایک پاؤچ A اور ایک پاؤچ B پورا کا پورا 1 لیٹر پانی میں تحلیل کیا جاتا ہے یہاں تک کہ ایک شفاف مائع حاصل ہو جاتا ہے۔ اس محلول کا 1 لیٹر 1 گھنٹے میں (بر 10-15 منٹ پر ایک پورا گلاس) پیئیں۔ اس کے بعد، اسی طریقے سے تیار کردہ مووی پریپ (MOVIPREP) کا دوسرا لیٹر پیئیں۔ جانچ کے لئے تیاری کرنے کے واسطے، آپ کو مزید ایک لیٹر دیگر شفاف مائع جیسے پانی، چائے، یا گل بابونہ کی چائے بھی پینا ضروری ہے۔

CONTROINDICAZIONI – متضاد اشارے:

درج ذیل کیفیات والے مریضوں کو یہ تیاری والی دوا ہرگز نہیں پینی چاہیے: **فینائل کیٹونیوریا (fenilchetonuria)** اسپارٹیم پر مشتمل تیاری والی دوا اور **فیوہزم (favismo)**، جس کو گلوکوز-6-فاسفیٹ ڈیہائیڈروجنیسیس ڈیفیسیئنسی بھی کہا جاتا ہے (اسکاربک ایسڈ / اسکاربیٹ پر مشتمل تیاری والی دوا)

اگر آپ کی کولونواسکوپ صبح میں (صبح 9:00 بجے تا دوپہر 1:00 بجے) ہے

کولونواسکوپ سے قبل والی شام میں، شام 6:00 بجے تا شام 7:00 بجے:
1 لیٹر محلول پیئیں، اور اس کے فوراً بعد، مزید ایک لیٹر پانی یا دیگر مشروب (چائے، گل بابونہ کی چائے) پیئیں۔
جانچ والی صبح میں، صبح 7:00 بجے تا صبح 8:00 بجے:
محلول کا دوسرا لیٹر (اور، اس کے فوراً بعد، پانی کا دوسرا لیٹر) پیئیں۔

اگر آپ کا کولونواسکوپ سہ پہر میں (دوپہر 2:00 بجے کے بعد) ہے

کولونواسکوپ سے قبل والی شام کو، شام 6:00 بجے تا شام 7:00 بجے:
تیاری والی دوا کا 2 پاؤچ (1 پاؤچ A + 1 پاؤچ B) جو 1 لیٹر پانی میں تحلیل کیا ہوا ہو پیئیں اور، اس کے فوراً بعد، ایک لیٹر مزید پانی پیئیں۔
جانچ والی صبح میں، صبح 10:00 بجے تا صبح 11:00 بجے:
تیاری والی دوا کا 2 پاؤچ (1 پاؤچ A + 1 پاؤچ B) جو 1 لیٹر پانی میں تحلیل کیا ہوا ہو پیئیں اور، اس کے فوراً بعد، ایک لیٹر مزید پانی پیئیں۔