

ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ

ਖੁਰਾਕ

10-15 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ, ਹਰ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

10 ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜਨ = 100-150 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਨੂੰ ਹਰ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ
ਬਾਅਦ ਦੇਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ

50 ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ 50 ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ

(ਜੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ

6 ਕਿਗ੍ਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ)

ਖੁਰਾਕ

10 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜਨ, ਹਰ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ:

10 ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜਨ = 100 ਮਿਗ੍ਰਾ ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਨੂੰ ਹਰ 6-8 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ
ਦੇਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ 50
ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 1200 ਮਿਗ੍ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜਨ 50 ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ

- ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੈਕੇਟ ਨਾਲ ਨੱਥੀ
ਕੀਤੇ ਡਿਸਪੈਸਰ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ
ਦੇ ਡਿਸਪੈਸਰਾਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ।
- ਉਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਤਾਵ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਲਈਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਅਤੇ
ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਪਰਹੋਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿ ਵਧੇ
ਸਕਦੇ ਹਨ।
- **ਆਈਬੂਪ੍ਰੋਫੇਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ** ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਫੇਖਾਈਲ ਦੌਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।



ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ ਦਰਦ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ

ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ

ਰੇਜ਼ੀਓ ਐਮਿਲੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਜ਼ੀਡਾ ਯੂਨੈਸਕੋ -
ਆਈਆਰਸੀਸੀਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ
ਹਸਪਤਾਲ ਅਧਾਰਤ ਬਾਲ ਚਿਕਿਤਸਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ
ਕੀਤਾ ਸੂਚਕ ਇਸਤਿਹਾਰ




ਭੂਮਿਕਾ

ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਅਤੇ ਆਈਬ੍ਰੂਪ੍ਰੇਫੇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟਿਕਲਸ ਹਨ।

ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੋਸਿਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

**12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਸਪਿਰਿਨ
(ਏਸਿਟਾਈਲਸੈਲੀਸਿਲਿਕ ਐਸਿਡ) ਨਾ ਦਿਓ**



ਦਵਾਈ

- ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ

ਸਿਸ੍ਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ: ਬੂਂਦਾਂ, ਸਿਰਪ, ਸੈਸੈ, ਗੋਲੀਆਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਣਸ਼ੀਲ ਸੂਤਰੀਕਰਨ।

ਚੇਤਾਵਨੀ

ਬੂਂਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਰਪ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਖੁਰਾਕ

10-15 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਸਹੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਦਾਹਰਣ 10 ਕਿਗ੍ਰਾ
ਵਜ਼ਨ = $100-150$ ਮਿਗ੍ਰਾ ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ 6-8
ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਅਤੇ
ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 80 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50
ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 3 ਗ੍ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ
50 ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ।

ਆਈਬ੍ਰੂਪ੍ਰੇਫੇਨ

ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਤੇ 6 ਕਿਗ੍ਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀਰ ਦੇ ਵਜ਼ਨਲੋਂ ਸੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੈਰਾਸਿਟਾਮੋਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ।

ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਿਰਪ, ਗੋਲੀਆਂ, ਪੁਲਣਸ਼ੀਲ ਸੈਸੈ, ਬੂਂਦਾਂ।

ਖੁਰਾਕ

10 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਸਹੀਰ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10
ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜ਼ਨ 100 ਮਿਗ੍ਰਾ ਆਈਬ੍ਰੂਪ੍ਰੇਫੇਨ) ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ
ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇਹਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਤਮ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਮਿਗ੍ਰਾ ਪ੍ਰੀ ਕਿਗ੍ਰਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ
ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ
ਵਿੱਚ 1200 ਮਿਗ੍ਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ 50 ਕਿਗ੍ਰਾ ਨਾਲੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਇਸਨੂੰ ਭਰੇ ਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ-ਥੋੜਾ
ਪਰਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਦੱਸੋ ਹੋਏ, ਤਰਲ
ਦੀ ਕਾਢੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣਾ ਸਭਤੋਂ ਵਧੀਆ
ਵਿਕਲਪ ਹੈ।

ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ
ਉਪਯੋਗ ਨਾ ਕਰੋ।

ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਕੇਟ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਕੇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ
ਕਰੋ।