



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia**

IRCCS Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia

Presidio Ospedaliero Arcispedale S. Maria Nuova

Dipartimento Neuro-Motorio

**Ortopedia**

Dott. Ettore Sabetta - Direttore

# **INFORMATIVA SULLA TERAPIA DI DECOLONIZZAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI POSITIVITA' DEL TAMPONE NASALE**



**Agosto 2020**

Hanno Collaborato:

Cristina Rimessi - *Coordinatore Infermieristica Day Hospital Ortopedia*

Sonia Tarantola - *Coordinatrice Infermieristica Ortopedia Degenza*

Simona Lavorato - *Infermiera Day Hospital Ortopedia*

Ermanno Gabbi, *Dirigente Medico, S.C. Malattie Infettive*

Autorizzato da: Dott. Ettore Sabetta - *Direttore S.C. Ortopedia*

## ***GENTILE SIGNORA/SIGNORE,***

il tampone nasale per la ricerca dello staphylococcus aureus è risultato positivo. Questo germe non rappresenta un rischio per la sua salute, nè per quella dei suoi familiari, anche se fossero bambini.

Occorre tuttavia procedere alla decolonizzazione cutanea e delle mucose allo scopo di ridurre la concentrazione di batteri che rappresentano una possibile causa d'infezione post-operatoria.

*Per la decolonizzazione procedere alle seguenti azioni:*

### **APPLICAZIONI DI MUPIROCINA NASALE (BACTROBAN NASALE®) 2 VOLTE AL DI' PER 5 GG**

**Applicare una piccola quantità di unguento nasale (approssimativamente della dimensione di una testa di fiammifero) sul dito mignolo o su un bastoncino di cotone e applicarla all'interno di ciascuna narice, sulla parte anteriore; quindi chiudere le narici facendo pressione sui due lati del naso e massaggiare delicatamente con il pollice e l'indice, allo scopo di distribuire uniformemente l'unguento nasale all'interno delle narici.**

### **DURANTE I 5 GIORNI DI TRATTAMENTO**

1. Bagno/doccia quotidiani con un sapone antisettico a base di Clorexidina al 4%, insistere strofinando per 2-3 minuti in modo particolare su ascelle, inguine, regione sottomammaria, perineo e ombelico prima di risciacquare. *(La clorexidina ha necessità di un tempo di contatto e di essere strofinata per non soffermarsi allo stato superficiale della cute ma penetrare nei follicoli piliferi).*
2. Shampoo il 1° e il 5° giorno con un sapone antisettico a base di Clorexidina al 4% e disinfezione con alcool di pettini e spazzole.
3. Sostituzione dello spazzolino da denti e sciacqui del cavo orale 3 volte al dì per 5 gg con Clorexidina collutorio *(disinfezione anche delle protesi, se presenti).*
4. Cambio quotidiano di indumenti, biancheria intima e asciugamani e lenzuola. Utilizzare preferibilmente saponi liquidi e sostituire stick deodorante, se in uso.

**Per necessità contattare il personale dell'Ortopedia 0522 296332,  
ore 13.00-14.00.**