



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Arcispedale S. Maria Nuova



Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA PRÉPARATION À LA GASTROSCOPIE

L'œsophago-gastro-duodénoscopia requiert d'être à jeun au moins 6/8 heures avant la procédure. Si l'examen a lieu le matin, il est recommandé de rester à jeun à compter du soir précédent après un dîner léger. Par contre, si l'examen est programmé après 14h00, un petit déjeuner léger est autorisé le matin, avant 8h00, avec du thé et 2 biscuits ou 2 biscottes (pas de lait). Si le patient est diabétique, un jeûne d'au moins 12 heures est recommandé. Dans tous les cas, il est possible de boire jusqu'à une heure avant l'examen (thé, eau ou eau sucrée en quantités modérées).

PER CHI ASSUME FARMACI O E' AFFETTO DA MALATTIE POUR LES PERSONNES PRENANT DES MÉDICAMENTS OU SOUFFRANT DE MALADIES

Avant l'examen, il est important de signaler au médecin endoscopiste les éventuelles maladies graves, les thérapies médicamenteuses ou les allergies.

Si le patient prend des médicaments anticoagulants (Sintrom, Coumadin, nouveaux anticoagulants oraux, etc.), il devra contacter, une dizaine de jours avant l'examen, le médecin généraliste ou le centre d'hémostase de référence afin de se présenter, le jour de l'examen endoscopique, avec une valeur de l'INR inférieure à 2 (le dosage devra être effectué le jour précédent ou le jour de la procédure).

Si le patient prend des médicaments antiagregants en monothérapie (Aspirinetta, Ascriptin, Cardirene, Tiklid, Plavix, etc.), il pourra continuer la thérapie en la suspendant le matin de la procédure. Par contre, s'il prend plusieurs médicaments antiagregants (par ex. aspirine + clopidogrel, etc.), il est conseillé de s'adresser à son médecin généraliste ou à son cardiologue concernant la possibilité de suspendre temporairement la prise de l'un des deux médicaments.

Le jour de l'examen, le patient peut continuer les thérapies en cours (les médicaments pour le cœur, la respiration, la pression, la circulation, les antiagregants, etc.). Toutefois, les médicaments ne doivent pas être pris durant l'heure précédant le début de l'examen endoscopique.

Si le patient est allergique au latex, contacter le secrétariat ou le coordinateur du service au moins une semaine avant l'examen.

En cas de doutes, le patient pourra s'adresser au service de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive pour recevoir des instructions à ce sujet.

RACCOMANDAZIONI GENERALI RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Avant l'examen, il est nécessaire de retirer les éventuelles prothèses dentaires mobiles.

Apporter son dossier de santé précédent inhérent à l'examen endoscopique.

Si le patient souhaite effectuer la gastroscopie sous sédation, il doit obligatoirement être accompagné puisque, au cours des 12 heures suivant l'examen, il ne devra effectuer aucune activité nécessitant des réflexes rapides, comme conduire un véhicule ou même marcher tout seul dehors.