



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Arcispedale S. Maria Nuova



Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA PREGĂTIREA PENTRU GASTROSCOPIE

Pentru efectuarea esofago-gastro-duodenoscopiei este necesar să nu se mănânce timp de cel puțin 6/8 ore înainte.

Dacă investigația este efectuată dimineața se recomandă să nu se mănânce începând din seara anterioară, după o cină ușoară; dacă, în schimb, investigația este programată după ora 14.00 este permis un mic-dejun ușor, înainte de ora 8 dimineață, cu ceai și 2 biscuiți sau 2 felii de pâine prăjită (fără lapte).

Dacă pacientul este diabetic se recomandă ca acesta să nu mănânce timp de 12 ore înaintea investigației.

În toate cazurile pacientul poate bea până la o oră înaintea investigației ceai, apă sau apă îndulcită, în cantități reduse.

PER CHI ASSUME FARMACI O E' AFFETTO DA MALATTIE PENTRU PERSOANELE CARE URMEAȚĂ UN TRATAMENT MEDICAMENTOS SAU SUFERĂ DE BOLI

Înainte de efectuarea investigației este important ca medicul endoscopist să fie informat cu privire la orice boli importante, tratamente medicamentoase sau alergii.

Dacă ia medicamente anticoagulante (Sintrom, Coumadin, noi anticoagulante orale...), pacientul va trebui să contacteze cu zece zile înainte medicul generalist sau centrul de hemostază de referință, astfel încât să se prezinte în ziua investigației cu o valoare a INR mai mică de 2 (dozarea va trebui efectuată în ziua anterioară sau în ziua procedurii).

Dacă ia medicamente antiagregante plachetare în monoterapie (aspirină cardio, ascriptin, cardirene, tiklid, plavix...) pacientul va putea continua tratamentul, întrerupându-l în dimineața procedurii; dacă, în schimb, ia mai multe medicamente antiagregante plachetare (de ex. aspirină + clopidogrel...) se recomandă contactarea medicului generalist sau a cardiologului pentru a obține informații cu privire la posibilitatea de a întrerupe temporar unul dintre cele două medicamente.

În ziua investigației pacientul va putea continua tratamentele curente (medicația pentru inimă, respirație, presiune, circulație, antiagregantele plachetare etc.); în orice caz, medicamentele nu mai trebuie luate începând cu o oră înainte de investigația endoscopică.

Dacă pacientul este alergic la latex trebuie să contacteze secretariatul sau coordonatorul serviciului cu cel puțin o săptămână înainte.

Dacă are nelămuriri, pacientul se va putea adresa serviciului de gastroenterologie și endoscopie digestivă pentru a primi instrucțiunile necesare.

RACCOMANDAZIONI GENERALI RECOMANDĂRI GENERALE

Înaintea investigației trebuie scoase protezele dentare mobile.

Trebuie adusă documentația medicală anterioară de care se dispune cu privire la investigația endoscopică.

Dacă pacientul dorește să fie sedat pentru efectuarea investigației trebuie să fie neapărat însoțit, deoarece în următoarele 12 ore nu trebuie efectuate activități care necesită reflexe prompte, precum conducerea unui vehicul sau chiar mersul pe stradă neînsoțit.