

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Oncologico e Tecnologie Avanzate  
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

## **PREPARAZIONE ALLA GASTROSCOPIA ПОДГОТОВКА К ГАСТРОСКОПИИ**

Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) делается натощак: прием пищи прекращается, по меньшей мере, за 6 - 8 часов до проведения процедуры.

Если исследование проводится утром, рекомендуется прекратить прием пищи с предшествующего процедуре вечера после легкого ужина, если же исследование планируется после 14.00, допускается легкий завтрак утром, не позднее 8 часов, с чаем и 2 кусочками печенья или 2 хрустящими хлебцами (без молока).

Если пациент диабетик, рекомендуется прекратить прием пищи, по меньшей мере, за 12 часов до проведения исследования.

В любом случае, пить стоит прекратить за час до проведения процедуры, до этого времени можно употреблять чай, воду или сладкую воду, но в умеренных количествах.

## **PER CHI ASSUME FARMACI O E' AFFETTO DA MALATTIE ДЛЯ ТЕХ, КТО ПРИНИМАЕТ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ИЛИ СТРАДАЕТ КАКИМИ-ЛИБО ЗАБОЛЕВАНИЯМИ**

До проведения исследования следует сообщить врачу-эндоскописту о возможных серьезных заболеваниях, принимаемом фармакологическом лечении или аллергиях, если таковые имеются.

Если принимаются противоклоагулирующие лекарственные препараты (Sintrom, Coumadin, новые противоклоагулирующие средства для внутреннего употребления и т.д.), пациент должен обратиться примерно за десять дней до выполнения процедуры к врачу общей практики или в соответствующий центр гемостаза для того, чтобы в день проведения эндоскопического исследования его международный коэффициент нормализации (INR) был ниже 2 (количественный анализ должен осуществляться в предыдущий день или в день проведения исследования).

Если принимаются антитромбоцитарные препараты в курсе монотерапии (Aspirinetta, ascriptin, cardirene, tiklid, plavix и т.д.), пациент сможет продолжать лечение, приостановив его только утром, в день проведения процедуры; если же принимается несколько антитромбоцитарных препаратов (например, аспирин + клопидогрел и т.д.), рекомендуется обратиться к своему врачу общей практики или к своему кардиологу относительно возможности временной приостановки приема одного из двух лекарственных препаратов.

В день проведения исследования пациент может продолжить текущее лечение (прием лекарств для сердца, дыхания, давления, кровообращения, антитромбоцитарных средств и т.д.); в любом случае, лекарственные препараты не должны приниматься за час до начала эндоскопического исследования.

Если пациент страдает от аллергии на латекс, свяжитесь с секретарем или координатором службы хотя бы за неделю до проведения исследования.

В случае каких-либо сомнений пациент может обратиться в службу гастроэнтерологии и эндоскопии пищеварительной системы для получения соответствующих инструкций.

## **RACCOMANDAZIONI GENERALI ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ**

Перед исследованием необходимо снять имеющиеся съемные зубные протезы (при их наличии).

Следует принести свою предыдущую медицинскую документацию, имеющую отношение к эндоскопическому исследованию.

Если пациент хочет, чтобы гастроскопия выполнялась с седацией, он обязательно должен сопровождаться другими лицами, так как в течение 12 часов после выполнения процедуры необходимо воздерживаться от осуществления любой деятельности, требующей быстроты реакции, как, например, вождение автомобиля или даже просто ходьба по улице без сопровождения.