

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Arcispedale S. Maria Nuova
Dipartimento Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

PREPARAZIONE ALLA COLONSCOPIA **PREGĂTIREA PENTRU COLONOSCOPIE**

În timpul pregătirii pentru explorare și chiar și în ziua explorării pacientul poate continua tratamentele curente (medicația pentru inimă, respirație, presiune, circulație, antiagregantele plachetare etc.).

Nu luați alte purgative.

Nu utilizați tampoane interne în ziua explorării.

SUSPENDAȚI ORICE TRATAMENT ANTICOAGULANT CONFORM INDICAȚIILOR MEDICULUI

INDICAZIONI PER LA PULIZIA DELL'INTESTINO **INDICAȚII PENTRU CURĂȚAREA INTESTINULUI**

Nu mâncați fructe și legume în **săptămâna** dinaintea explorării (coaja și semințele pot îngreuna investigația, în special kiwi-ul, căpșunile și strugurii).

În timpul administrării soluției preparate și până la două ore înaintea explorării puteți bea: apă, ceai, ceai de mușețel și cafea din orz, chiar și îndulcite.

Ce puteți mânca:

- în seara dinaintea explorării puteți mânca o supă fără legume, o supă cu găluști sau o supă de carne;


- în ziua explorării, la micul dejun puteți consuma: ceai, cafea, miere, zahăr și două sau trei felii crocante de pâine.

AVERTIZĂRI: apariția senzației de greață sau de dezgust atunci când beți soluția preparată este normală și nu reprezintă un motiv de îngrijorare.

Este suficient să beți soluția mai încet, cu înghițituri mici (dacă este păstrată în frigider poate avea un gust mai bun).

Gustul soluției preparate poate fi îmbunătățit adăugând alte băuturi.

În orice caz, pentru ca explorarea să se desfășoare în mod corect trebuie băută toată soluția pentru curățarea intestinului.



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Arcispedale S. Maria Nuova
Dipartimento Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

MODALITÀ DI ASSUNZIONE DEL PREPARATO PER LA PULIZIA DELL'INTESTINO **MODUL DE ADMINISTRARE AL SOLUȚIEI PENTRU CURĂȚAREA INTESTINULUI**

PREPARATO AD ALTO VOLUME SELG ESSE 1000

(Prodotto a base di Sodio solfato e Polietilenglicole - PEG)

SOLUȚIA CU VOLUM RIDICAT SELG ESSE 1000

(Produs pe bază de Sulfat de sodiu și Polietilenglicol - PEG)

COME ASSUMERE IL PREPARATO **CUM SE ADMINISTREAZĂ SOLUȚIA**

Dizolvați fiecare dintre cele 4 plicuri de SELG (SELG) într-un litru de apă **plată**.

Beți repede un pahar mare de soluție **la fiecare 15 minute**.

Dacă, după ce ați băut soluția preparată și până la 2-3 ore înaintea explorării, intestinul nu este bine curățat (respectiv dacă ultimele scaune nu sunt apoase și limpezi) trebuie să beți un alt litru de soluție.

QUANDO ASSUMERE IL PREPARATO **CÂND SE ADMINISTREAZĂ SOLUȚIA**

ÎN CAZUL ÎN CARE COLONOSCOPIA SE EFECTUEAZĂ DIMINEAȚA (între orele 9.00 și 13.00)

ÎN DUPĂ-AMIAZA DINAINTEA EXPLORĂRII ENDOSCOPICE, ÎNTRE ORELE 18.00 ȘI 21.00:

BEȚI: 3 plicuri de soluție dizolvate în 3 litri de apă (1 litru la fiecare oră).

În DIMINEAȚA explorării, între orele 7.00 și 8.00:

BEȚI un plic de soluție dizolvat într-un litru de apă.


ÎN CAZUL ÎN CARE COLONOSCOPIA SE EFECTUEAZĂ DUPĂ-AMIAZA (DUPĂ ORA 14.00)

ÎN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DINAINTEA EXPLORĂRII ENDOSCOPICE, ÎNTRE ORELE 18.00 ȘI 20.00:

BEȚI: jumătate din doza (2 litri) de soluție pentru curățarea intestinului.

În DIMINEAȚA zilei explorării, între orele 9.00 și 11.00:

BEȚI cealaltă jumătate din doza de soluție (alți 2 litri)



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

Arcispedale S. Maria Nuova
Dipartimento Tecnologie Avanzate
Gastroenterologia - Endoscopia Digestiva

Dott. Romano Sassatelli - Direttore

ÎN ALTERNATIVĂ: PREPARATO A BASSO VOLUME MOVIPREP
(MACROGOL 3350+ACIDO ASCORBICO)
SOLUȚIA CU VOLUM REDUS MOVIPREP
(MACROGOL 3350+ACID ASCORBIC)

Pentru a vă pregăti în mod corect pentru investigație trebuie să beți 2 litri de MOVIPREP (MOVIPREP). Ambalajul conține 2 plicuri transparente, în fiecare plic transparent aflându-se un pliculeț mare A și un pliculeț mic B.

Un litru de MOVIPREP (MOVIPREP) se prepară dizolvând complet un pliculeț A și un pliculeț B într-un litru de apă, până când se obține o soluție lichidă transparentă. Beți 1 litru de soluție preparată în interval de 1 oră (un pahar plin la fiecare 10-15 minute). Apoi beți încă un litru de MOVIPREP (MOVIPREP) pregătit în același fel.

Pentru a vă pregăti pentru explorare trebuie să beți și 1 litru de alte lichide limpezi: apă, ceai sau ceai de mușețel.

CONTROINDICAZIONI – CONTRAINDICAȚII:

nu trebuie să bea soluția pacienții care suferă de **fenilcetonurie (fenilchetonuria)** (conține aspartam) și **favism (favismo)** (deficit de glucozo-6-fosfat dehidrogenază, conține acid ascorbic/ascorbat)

ÎN CAZUL ÎN CARE COLONOSCOPIA SE EFECTUEAZĂ DIMINEAȚA (între orele 9.00 și 13.00)

ÎN DUPĂ-AMIAZA DINAINTEA EXPLORĂRII ENDOSCOPICE, ÎNTRE ORELE 18.00 ȘI 19.00:

BEȚI: 1 litru de soluție preparată și, imediat după aceasta, beți un alt litru de apă sau alte băuturi (ceai, ceai de mușețel)

În DIMINEAȚA explorării, între orele 7.00 și 8.00:

BEȚI celălalt litru de soluție preparată (și, imediat după aceasta, beți un alt litru de apă).

ÎN CAZUL ÎN CARE COLONOSCOPIA SE EFECTUEAZĂ DUPĂ-AMIAZA (DUPĂ ORA 14.00)

ÎN DUPĂ-AMIAZA ZILEI DINAINTEA EXPLORĂRII ENDOSCOPICE, ÎNTRE ORELE 18.00 ȘI 19.00:

BEȚI: 2 pliculețe (1 pliculeț A + 1 pliculeț B) de soluție dizolvate într-un litru de apă și, imediat după aceasta, beți un alt litru de apă.

În DIMINEAȚA explorării, între orele 10.00 și 11.00: **BEȚI:**

2 pliculețe (1 pliculeț A + 1 pliculeț B) de soluție dizolvate într-un litru de apă și, imediat după aceasta, beți un alt litru de apă.